Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium (MG) er en kønssygdom, der skyldes en bakterie. Den smitter ved sex. Omkring halvdelen mærker ingenting. Bakterien er ofte modstandsdygtig over for de almindelige typer antibiotika, og derfor undersøger vi prøven nærmere, før vi vælger behandling. Bagefter skal du have en kontrolprøve.

1
Ofte ingen symptomer
Omkring halvdelen mærker intet.

2
Resistenstest først
Vi finder ud af, hvilket antibiotikum der virker.

3
Fortæl det
Til partnere fra de seneste 4 uger.

4
Kontrolprøve
Tidligst 3 uger efter endt behandling.

Sådan kan du mærke det

- **Svie**, når du tisser
- Udflåd fra skeden eller penis
- Kvinder: pletblødning

Hvorfor er det vigtigt at blive behandlet?

- Kvinder: betændelse i livmoder og æggeledere og langvarige smerter i underlivet. **Sjældent** nedsat frugtbarhed
- Mænd: betændelse i bitestiklen

Sådan foregår det

1 · Test
Urinprøve eller podning.

→

2 · Resistenstest
Prøven undersøges for, hvilke typer antibiotika bakterien er modstandsdygtig over for. Det kan tage **op til 5 arbejdsdage**.

→

3 · Antibiotika
Vi vælger den type, der virker. **Tag hele kuren**, også hvis generne forsvinder.

→

4 · Kontrol
Ny prøve **tidligst 3 uger efter** endt behandling. Den viser, om behandlingen har virket.

Mens du bliver behandlet

- **Undgå sex**, til både du og din partner er færdigbehandlet
- Fortæl det til **alle partnere fra de seneste 4 uger**, så de kan blive testet
- Er det svært at få sagt, så tal med os om det

Kontakt klinikken, hvis …

- du stadig har gener, når kuren er slut
- du får **smerter i underlivet**, feber eller ømme testikler
- du er **gravid**

Forebyg

Kondom beskytter mod Mycoplasma genitalium. Brug det ved al sex med partnere, der ikke er faste.

Kort fortalt: test → resistenstest (op til 5 arbejdsdage) → det rette antibiotikum → ingen sex, til I begge er færdigbehandlet → kontrolprøve tidligst 3 uger efter.

Kilder: Lægehåndbogen, sundhed.dk: *Mycoplasma genitalium* · Patienthåndbogen, sundhed.dk: *Mycoplasma genitalium*.