Klamydia

Klamydia er en kønssygdom, der skyldes en bakterie. Den smitter ved vaginal-, anal- og oralsex. De fleste mærker ingenting, og derfor kan man gå rundt med den og smitte andre uden at vide det. Klamydia behandles let med antibiotika, men ubehandlet kan den give betændelse i underlivet og nedsat frugtbarhed.

1
Ofte ingen symptomer
Op til 8 ud af 10 kvinder og 5 ud af 10 mænd mærker intet.

2
Antibiotika
Typisk en kur på 7 dage.

3
Ingen sex
Under behandlingen og 7 dage efter.

4
Fortæl det
Til alle partnere fra de seneste 6 måneder.

Sådan kan du mærke det

- **Svie**, når du tisser
- Udflåd fra skeden eller penis
- Kvinder: pletblødning eller blødning efter samleje
- Mænd: smerter i testiklerne

Hvorfor er det vigtigt at blive behandlet?

- Kvinder: **betændelse i livmoder og æggeledere**, langvarige smerter i underlivet og graviditet uden for livmoderen. Omkring **3 ud af 100** bliver ufrugtbare
- Mænd: betændelse i bitestiklen
- Sjældent ledbetændelse

Sådan foregår det

1 · Test
Urinprøve eller podning. Du får svar, når prøven er undersøgt.

→

2 · Antibiotika
Tag hele kuren, også hvis generne forsvinder. Læs indlægssedlen.

→

3 · Ingen sex
Under behandlingen og **7 dage efter endt behandling**, og til din partner også er færdigbehandlet.

→

4 · Partnere
Alle partnere fra de **seneste 6 måneder** skal testes og behandles.

Fortæl det til dine partnere

Det er vigtigt, fordi de fleste ikke selv har symptomer. Uden behandling kan de få følgevirkninger og smitte dig igen. Er det svært at få sagt, så tal med os om det.

Kontrol

- En ny prøve er **normalt ikke nødvendig**
- Har du stadig gener efter behandlingen, så kontakt os
- Skal der tages en ny prøve, sker det **tidligst 4 uger** efter behandlingen. Ellers kan den stadig være positiv

Er du gravid?

Så **sig det til os**. Behandlingen er en anden, og ikke al antibiotika må bruges under graviditet.

Forebyg

Kondom beskytter mod klamydia. Brug det ved al sex med partnere, der ikke er faste.

Kort fortalt: ofte ingen symptomer → antibiotika i 7 dage → ingen sex under behandlingen og 7 dage efter → fortæl partnere fra de seneste 6 måneder → kondom.

Kilder: Lægehåndbogen, sundhed.dk: *Klamydiainfektion* · Patienthåndbogen, sundhed.dk: *Klamydia*.